

# レジメン名 FOLFIRI+サイラムザ

1クール14日

RP	手技	薬剤名	用量	投与日	投与時刻	投与経路	投与時間(分)
注射用抗がん薬及び支持療法薬(day1~day3)							
1	点滴静注	グラニセトン注 デキサート注 ポララミン注	1mg/50mL 1本 1.65mg 6A 5mg 1A	day1	9:30	末梢メイン1	30min
2	点滴静注	サイラムザ注射液 生理食塩水	8mg/kg 250mL	day1	10:00	末梢メイン1 フィルターを 通す	60min
3	点滴静注	生理食塩水	50mL	day1	11:00	末梢メイン1	30min
4	点滴静注	レボホリナート点滴静注 5% ブドウ糖液	200mg/m <sup>2</sup> 250mL	day1	11:30	末梢側管1	120min
5	点滴静注	イリノテカン注 5% ブドウ糖液	150mg/m <sup>2</sup> 250mL	day1	11:30	末梢メイン1	90min
6	点滴静注	フルオロウラシル注 生理食塩水	400mg/m <sup>2</sup> 100mL	day1	13:30	末梢側管1	10min
7	点滴静注	フルオロウラシル注 生理食塩水	2400mg/m <sup>2</sup> 50mL	day1 ~ day3	13:40	末梢メイン1	46時間持続
8	点滴静注	生理食塩水	20mL	day3	11:40	末梢メイン1	フラッシュ用